


新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(一)新冠疫苗“三”常识


1.本次使用的是**什么疫苗**？

本次使用的是全病毒灭活疫苗。




(1) 什么是灭活疫苗？

采用化学等方法使新冠病毒失去感染性和复制力，同时保留能引起人体免疫应答活性而制备成的疫苗。



(2) 灭活疫苗的**七大优势**

一是研发平台成熟；
二是生产工艺稳定；
三是质量标准可控；
四是保护效果良好；
五是研发速度快；
六是易于规模化生产；
七是具有国际通行的安全性和有效性评判标准。



新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(一)新冠疫苗“三”常识

2.接种新冠疫苗有哪些好处？



我国接受了紧急接种的高风险暴露人群中，有6万多人赴境外高风险地区，经过严格追踪观察，未发现严重感染的病例报告。

随访到的一些聚集性感染的案例显示，接种了疫苗的人的感染风险和严重程度均低于未接种疫苗人群。

接种疫苗后可刺激机体产生抗新型冠状病毒的免疫力，提示疫苗具有潜在的临床应用价值。

3.病毒变异会对疫苗效果产生影响吗？



病毒会发生变异，大多数变异不会影响病毒的致病性、检测试剂敏感性和疫苗的有效性。

根据世界卫生组织最新发布的信息，尚无证据证明病毒变异会使现有的新冠病毒疫苗失效。



新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(二) 接种疫苗十二问

1. 哪些人不适合接种？

- ① 年龄 < 18岁或 ≥ 60岁；
- ② 既往发生过疫苗接种严重过敏反应（如急性过敏反应、荨麻疹、皮肤湿疹、呼吸困难、血管神经性水肿、腹痛）；
- ③ 患有血小板减少症或者出血性疾病者；
- ④ 惊厥、癫痫、脑病、其他进行性神经系统疾病和精神疾病史或家族史；
- ⑤ 严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压（收缩压 ≥ 140mmHg，舒张压 ≥ 90mmHg）、糖尿病并发症、恶性肿瘤；
- ⑥ 已被诊断为患有先天性或获得性免疫缺陷、HIV感染、淋巴瘤、白血病或其他自身免疫疾病；
- ⑦ 已知或怀疑患有先天性或获得性免疫缺陷、HIV感染、淋巴瘤、白血病或其他自身免疫疾病；
- ⑧ 孕妇、哺乳期妇女；
- ⑨ 发热、各种急性疾病、慢性疾病急性发作期，如感染性疾病（急性上呼吸道感染、感染性腹泻）在完全康复后方可接种。



新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(二) 接种疫苗十二问

2. 公众何时可以开始接种新冠疫苗？

按照“两步走”方案，在全市范围内实施接种：



第一步

主要是针对重点人群开展接种，包括从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的工作人员，以及前往中高风险国家或者地区去工作或学习的人员。



第二步

随着疫苗获批上市，以及疫苗产量的逐步提高，将会有更多的疫苗投入使用。通过有序开展接种，符合条件的群众都能实现“应接尽接”。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(二) 接种疫苗十二问

3. 在哪里接种新冠疫苗？



本次新冠病毒疫苗接种点分为两类：

一是预防接种门诊，
二是临时接种点。

各区将根据摸底情况设置接种点，具体接种地点，请相关接种人员关注所在单位和区里的通知，有序进行接种。

4. 接种新冠疫苗怎么预约？



目前重点人群紧急接种新冠疫苗暂不采取个人预约方式。

因私出境工作、学习人员：

(1) 请持以下材料：

本地户口簿或居住证、护照、有效签证（不含对华免签或落地签国家）、必要的证明材料，如机票、劳务公司出具的证明、境外学校出具的录取通知书或邀请函等。

(2) 到居住地所在街道（乡镇）或社区服务站进行资料审核。

(3) 审核通过后可到指定的接种机构进行接种，具体情况请关注相关通知。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(二) 接种疫苗十二问

5. 新冠疫苗打几针？



推荐免疫程序为2针，期间至少间隔14天，接种部位为上臂三角肌。

随意调整免疫程序可能影响安全性、免疫应答效果和免疫持久性。

新冠疫苗接种的时间间隔请严格按照疫苗说明书执行，接种第一剂疫苗后，请按接种单位预约时间进行第二剂疫苗接种。

6. 新冠疫苗和其他疫苗可以一起打吗？



不建议与其他疫苗同时接种。

目前国内所有可及的新冠疫苗均为灭活疫苗，相对来说安全性也较好。

不过，对于新冠疫苗这个疫苗家族新成员，我们建议：

(1) 在接种时间上最好能与其他疫苗分开，相隔至少两周以上，尽量减少非预期的相互影响；

(2) 密切观察接种后的反应。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(二) 接种疫苗十二问

7. 接种新冠疫苗要注意哪些事情？



(1) 接种新冠疫苗前：

主动提供健康状况；
按要求携带身份证；
做好个人防护；
了解接种点的接种流程。



(2) 接种疫苗时：

认真阅读并如实填写疫苗接种知情同意书；
接种完毕需在接种点留观30分钟。



(3) 接种新冠疫苗后：

休息多喝水；
保证接种部位的清洁，当天不要见水；
一天之内注意观察体征，如果出现持续发烧等现象，可以就近到医院就医，并向接种单位报告。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(二) 接种疫苗十二问

8. 接种新冠疫苗后， 抗体可持续多长时间？



病毒发现的时间还不长，所以现在说这个疫苗能保护多长时间还为时过早，还不能下这个结论。目前证据提示，按世界卫生组织规定要求，疫苗保护期达到半年以上，基本上没有问题。

9. 接种新冠疫苗可能会出现什么 不良反应？



常见的不良反应主要包括以下几方面：
头痛发热；
接种部位局部的红晕或者出现硬块；
可能出现咳嗽、食欲不振、呕吐、腹泻症状。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事



(二) 接种疫苗十二问

10. 出现不良反应怎么办？



接种对象完成接种后，应在接种现场留观30分钟方可离开，现场工作人员会告知受种者接种新冠疫苗常见不良反应、注意事项、后续健康状况观察、处置建议以及联系方式等。

回家后出现不良反应相关症状，可拨打知情同意书上的联系电话咨询接种点工作人员，必要时及时就医。

11. 打了新冠疫苗，还需要继续戴口罩吗？



到目前为止，任何疫苗的保护效果都不能达到100%，少数人接种后仍可能不产生保护力或发病。目前，人群免疫屏障尚未建立。

因此，接种疫苗后仍需要做好戴口罩、勤洗手、开窗通风、保持社交距离等个人防护措施。

12. 接种新冠疫苗后还需做核算检测吗？ 接种证明能否替代核酸检测报告？



接种疫苗可以在一定程度上降低感染风险，但任何疫苗的保护效果都不能达到100%，必要时仍应配合相关部门进行核酸检测。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事

(三)“八”类人群要注意



1. 备孕的人

- (1) 须在疫苗接种后适当推迟怀孕时间。
- (2) 参考其他灭活疫苗，建议在接种3个月以后怀孕。



2. 女性月经期

可以接种新冠疫苗。



3. 过敏性鼻炎患者

要考虑过敏体质的严重程度，并按照临床医师的医嘱执行。



4. 处于痛风发作期的患者

不宜接种新冠疫苗。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事

(三)“八”类人群要注意



5.常年吃药患有高血压的人

(1) 高血压患者通过生活方式调整和（或）药物治疗，血压低于140/90mmHg，可以正常接种新冠疫苗；

(2) 高血压患者通过生活方式和（或）药物治疗，收缩压 ≥ 140 mmHg和（或）舒张压 ≥ 90 mmHg，但当日血压值收缩压 < 160 mmHg且舒张压 < 100 mmHg，可予以接种。接种后，留观区医生需加强观察；

(3) 高血压患者通过生活方式和（或）药物治疗，但收缩压 ≥ 160 mmHg和（或）舒张压 ≥ 100 mmHg，建议暂缓接种。经调整高血压治疗方案，待血压控制收缩压 < 160 mmHg且舒张压 < 100 mmHg时，可以进行接种。



6.糖尿病人

(1) 糖尿病患者通过生活方式调整和（或）药物治疗，空腹血糖 ≤ 13.9 mmol/L，可正常接种新冠疫苗；

(2) 目前有糖尿病急性并发症（酮症酸中毒、高渗状态、乳酸酸中毒）或患有上述急性并发症痊愈未满2周的糖尿病患者，建议暂缓接种；

(3) 用于治疗糖尿病的各种药物（包括注射胰岛素），均不作为疫苗接种的禁忌；

(4) 1型糖尿病患者可参照2型糖尿病患者的相关标准。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事

(三)“八”类人群要注意



7.甲状腺疾病患者



- (1) 已经诊断并服用稳定剂量左甲状腺素（优甲乐）的甲状腺功能减退患者，可以进行接种；
- (2) 甲状腺功能减退患者TSH $>10\mu\text{IU/L}$ ，且T3、T4低于正常值时，建议暂缓接种；
- (3) 未控制的甲状腺功能亢进或甲亢性突眼患者，建议暂缓接种；
- (4) 正在服用治疗甲状腺功能减退的左甲状腺素（优甲乐）或抗甲状腺药物甲巯咪唑（赛治、他巴唑）、丙硫氧嘧啶，不作为疫苗接种的禁忌。

8.有心脏病、冠心病、冠状动脉粥样硬化的人



- (1) 如果处于急性发作期应暂缓接种疫苗；
- (2) 患有慢性疾病，在药物控制良好的情况下，原则上可以接种疫苗，请参考临床医师医嘱执行。

新冠疫苗接种 您要知道的那些事



丰台区新型冠状病毒疫苗临时接种点工作流程图

